



SIBEN

Mejorando el cuidado neonatal



PARTO

La madre puede y debe estar acompañada durante el parto y NO debería dejar de realizarse el contacto piel a piel con su bebé recién nacido con protección adecuada. Todo el personal de salud que la asiste debe contar y saber utilizar el equipo de protección personal.



BAÑO

No se recomienda el baño inmediato de ningún recién nacido y tampoco al hijo de una madre COVID 19 +. El baño no disminuye el riesgo de infección y origina daño al bebé.

Las siguientes organizaciones y publicaciones avalan estas recomendaciones

SIBEN www.siben.net Declaración Conjunta de SIBEN y Fundación NeNe: RIESGOS A LA SALUD MATERNO NEONATAL EN MEDIO DE LA PANDEMIA VIRAL DEL COVID-19 - Campus Virtual EPA SIBEN <http://www.siben.net/educacion>
Sola A, Rodríguez S, Cardetti M y Dávila C. COVID-19 perinatal en América Latina. Rev Panam Salud Publica. 2020;44:e47. <https://doi.org/10.26633/RPSP.2020.47>
Augusto Sola, Susana Rodríguez and Sergio G Golombek
COMMENT ON Caring for Newborns Born to Mothers With COVID-19: More Questions Than Answers Pediatrics 2020;146 (2) e2020001842; DOI: <https://doi.org/10.1542/peds.2020-001842>
World Health Organization. Clinical management of COVID-19. 2020. [https://www.who.int/publications-detail/clinicalmanagement-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novelcoronavirus-\(ncov\)-infection-issuspected](https://www.who.int/publications-detail/clinicalmanagement-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novelcoronavirus-(ncov)-infection-issuspected).
Italian Society of Neonatology endorsed by the Union of European Neonatal & Perinatal Societies. Matern Child Nutr. 2020;16(3): e13010 13.
Royal College of Paediatrics and Child Health. COVID-19 - guidance for neonatal settings. 2020. <https://www.rcpch.ac.uk/resources/covid-19-guidance-neonatalsettings#breastfeeding-by-covid-19-suspected-or-confirmed-mothers>.
Canadian Paediatric Society. Breastfeeding when mothers have suspected or proven COVID-19. 2020. <https://www.cps.ca/en/documents/position/breastfeedingwhen-mothers-have-suspected-or-proven-covid-19>. Centers for Disease Control and Prevention. Consideration for inpatient obstetric healthcare settings. 2020. Available at: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019>



SIBEN DE PIE

EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MADRES CON COVID-19 Y SUS RECIÉN NACIDOS

Neonatología SIN HUMANIDAD no es Neonatología

LACTANCIA

Se recomienda que si una madre desea amamantar no se le prohíba. Toda madre tiene derecho a ser informada y elegir si quiere amamantar a su hijo, utilizando las medidas de protección adecuadas, incluyendo higiene correcta de manos y senos. NO hay evidencia de que el virus se transmita a través de la leche humana. Si decide no amamantar, puede extraerse su leche y que ella misma o un cuidador alimente al bebé.



www.siben.net



SIBEN

Mejorando el cuidado neonatal

PROTECCIÓN PARA EVITAR CONTAGIO



El equipo de salud, la madre y su acompañante deben usar equipo de protección personal y mantener un lavado de manos frecuente antes y luego de todo contacto.



DIAGNÓSTICO

Si la mamá tiene un diagnóstico de COVID-19 positivo, su recién nacido debe ser estudiado precozmente para conocer su condición frente al virus mediante RT-PCR para SARS CoV-2 (los test rápidos o de anticuerpos no son diagnósticos). NO hay evidencia concreta hasta el momento que el virus se transmita antes del nacimiento durante el tercer trimestre.

ALOJAMIENTO CONJUNTO



La separación del binomio madre-hijo NO es una recomendación aceptada ni necesaria en ningún caso, salvo que la madre o el bebé requiera cuidados especiales o intensivos. Con medidas de protección y cuidando el distanciamiento, el niño puede estar alojado con su madre, si ninguno de ellos requiere internación por estar enfermos.

ALTA Y CUIDADOS EN EL HOGAR

El recién nacido y su madre deben ser dados de alta lo antes posible en cuanto su condición corresponda y continuar con los cuidados en el hogar.

AVALADO POR:

